

Anaftin® Gel

Anaftin® Gel contribuie la calmarea durerii provocate de leziunile bucale minore cum ar fi cele datorate stomatitei aftoase, ulcerărilor aftoase, precum și leziunilor minore provocate de aparatele și protezele dentare. De asemenea, este indicat și pentru ulcerățiile aftoase difuze.

Mod de acțiune:

Anaftin® Gel conține polivinilpirolidonă (PVP) și acid hialuronic, care formează o peliculă protectoare ce aderă la cavitatea bucală protejând zonele afectate printr-o barieră mecanică și ameliorând astfel durerea provocată de terminațiile nervoase expuse. Acidul hialuronic și *Aloe vera* din compoziție contribuie la vindecarea pe cale naturală a țesuturilor afectate.

Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați 1 sau 2 picături de gel pentru a acoperi întreaga zonă a ulcerăției sau a leziunii bucale. Evitați contactul direct dintre aplicator și leziune. Nu atingeți leziunea cu limba timp de cel puțin 2 minute pentru a permite formarea peliculei protectoare. După fiecare aplicare, puneți la loc capacul. Pentru un rezultat optim, evitați să mâncați sau să beți cel puțin o oră după aplicarea gelului.

Utilizați de 3 - 4 ori pe zi sau mai des, dacă este necesar.

Compoziție:

Apă, polivinilpirolidonă (PVP), maltodextrină, propilenglicol, ulei de ricin hidrogenat PEG-40, gumă xantan, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, hialuronat de sodiu, aromă, clorură de benzalconiu, EDTA disodic, zaharină sodică, glicirizat dipotasic, *Aloe barbadensis*

Precauții:

Fiecare tub de Anaftin® Gel trebuie utilizat numai de către un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucișată a aplicatorului și a gelului. Utilizarea Anaftin® Gel este contraindicată în cazul pacienților cu istoric cunoscut de reacții de hipersensibilitate la oricare dintre componente. Dacă sunteți gravidă, cereți sfatul medicului înainte de a folosi produsul. În cazul în care suferiți frecvent de ulcerății bucale, este recomandat să cereți sfatul medicului.

Atenționări și precauții:

A nu se utiliza după data de expirare sau în cazul în care tubul pare deteriorat sau curge. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura camerei, ferit de căldura directă. A nu se congela.

Conține:

8 ml

Fabricant:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Italia



Distribuit de

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Germania

Rev 09/2016

RO / V122247/01

Anaftin® Gel



V-No.:	V122247/01	TW-No.:	106443	BC-No.:	18-4032	Approved for printing:
Package:	N/A	Language:	Romanian			
Size:	150 x 210 mm	Weight:	N/A			
Printing colours:	1. Pantone 648	Braille transcrip.:	N/A			
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A	
Add. Info:	N/A	Date:	19.10.18	Melchert		