

Anaftin® Spray

Anaftin® Spray contribuie la calmarea durerii provocate de leziunile bucale minore cum ar fi cele datorate stomatitei aftoase, ulcerațiilor aftoase, precum și leziunilor minore provocate de aparatele și protezele dentare. De asemenea, este indicat și pentru ulcerările aftoase difuze.

Mod de acțiune:

Anaftin® Spray conține polivinilpirolidonă (PVP) și acid hialuronic, care formează o peliculă protectoare ce aderă la cavitatea bucală protejând zonele afectate printr-o barieră mecanică și ameliorând astfel durerea provocată de terminațiile nervoase expuse. Acidul hialuronic și *Aloe vera* din compoziție contribuie la vindecarea pe cale naturală a țesuturilor afectate.

Instrucțiuni de utilizare:

La prima utilizare a produsului, îndepărtați capacul și aplicați duza pulverizatorului. Îndreptați duza spre leziunea din interiorul gurii și pulverizați de 3 ori sau ori de câte ori este necesar pentru a acoperi zona afectată. Pentru un rezultat optim, evitați să mâncați sau să beți timp de cel puțin o oră după aplicare. Duza permite ca produsul să acopere cu maximum de efect, leziunile orale. Utilizați de 3 - 4 ori pe zi sau mai des, dacă este necesar.

Compoziție:

Apă, propilenglicol, polivinilpirolidonă (PVP), maltodextrină, *Aloe barbadensis*, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, ulei de ricin hidrogenat PEG-40, EDTA disodic, clorură de benzalconiu, hialuronat de sodiu, aromă, zaharină sodică, glicirizat dipotasic.

Precauții:

Utilizarea Anaftin® Spray este contraindicată în cazul pacienților cu istoric cunoscut de reacții de hipersensibilitate la oricare dintre componente. Dacă sunteți gravidă, cereți sfatul medicului înainte de a folosi produsul. În cazul în care suferiți frecvent de ulcerările bucale, este recomandat să cereți sfatul medicului.

Atenționări și precauții:

A nu se utiliza după data de expirare sau în cazul în care tubul pare deteriorat sau curge. A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura camerei, ferit de căldura directă. A nu se congela. Evitați contactul cu ochii.

Conține:

15 ml

Fabricant:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Italia



Distribuit de

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Germania

Rev 09/2016

RO / V122251/01

Anaftin® Spray



V-No.:	V122251/01	TW-No.:	106446	BC-No.:	18-4035	Approved for printing:		
Package:	N/A	Language:	Romanian					
Size:	150 x 210 mm	Weight:	N/A					
Printing colours:	1. Pantone 648	Braille transcrip.:	N/A					
Font size:	9,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code:	N/A
Add. Info:	N/A	Date:	19.10.18	Melchert				